

PROFIL CLIMAT 2023

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MINERVOIS AU CAROUX

Caractéristique du territoire



Altitude minimum : 29 m
Altitude maximum : 1 111 m


Type de climat : Climat méditerranéen franc
Station de mesure météorologique de référence : Montpellier-Mauguio

Indicateurs « Climat »

- Indicateur de température

Situation :

A l'échelle de l'Occitanie, le réchauffement moyen est évalué à +1,8°C entre les périodes 1901-1920 et 2001-2020, soit légèrement supérieur au réchauffement moyen mondial sur les continents de +1,53°C. Les trois années les plus chaudes depuis 1959 en Languedoc-Roussillon, 2014, 2018 et 2020, ont été observées au XXIe siècle.



Projections :


A l'échelle de la France, la température moyenne annuelle pourra augmenter de plus de 2 °C d'ici le milieu du XXIe siècle par rapport au climat récent, ce réchauffement étant plus marqué l'été que l'hiver.



- Indicateur de précipitations

Situation :

En ex-Languedoc-Roussillon, les précipitations printanières et automnales ne présentent pas d'évolution depuis 1961. Les précipitations estivales présentent une légère baisse des cumuls, et les précipitations hivernales présentent une baisse des cumuls plus marquée depuis 1961.



Projections :

A l'échelle de la France, les cumuls annuels de précipitations évoluent peu d'ici 2050, mais une légère baisse en été et une légère hausse en hiver sont cependant probables sur la majorité du pays.


Attention : Géorisques identifie une vulnérabilité inondations sur votre EPCI



- Indicateur de gel


Situation :

En ex-Languedoc-Roussillon, le nombre annuel de jours de gel est très variable d'une année sur l'autre, mais aussi selon les endroits : les gelées sont rares sur le littoral et plus fréquentes à l'intérieur des terres. En cohérence avec l'augmentation des températures moyennes, le nombre annuel de jours de gel diminue. Sur la période 1961-2010, la tendance observée en Languedoc-Roussillon est de l'ordre de 0 à -1 jour par décennie. 1974, 1982 et 2014 sont les années les moins gélives observées sur la région depuis 1959 en ex-Languedoc-Roussillon.



Projections :


A l'échelle de la France, le nombre annuel de jours de gel est prévu en forte baisse d'ici le milieu du XXIe siècle.



- Indicateur de chaleur

Situation :

En ex-Languedoc-Roussillon, le nombre annuel de journées chaudes (températures maximales supérieures à 25°C) est très variable d'une année sur l'autre, mais aussi selon les endroits : les journées chaudes sont plus fréquentes lorsqu'on s'éloigne du relief et de la mer Méditerranée. Sur la période 1959-2009, on observe une augmentation forte du nombre de journées chaudes, comprise entre 6 et 7 jours par décennie. 2009, 2011 et 2018 apparaissent aux premières places des années ayant connu le plus grand nombre de journées chaudes en ex-Languedoc-Roussillon.



Projection :

Dans beaucoup de régions, les jours très chauds étaient relativement rares dans le climat récent. A l'horizon 2050, ils seront rencontrés plusieurs fois par an avec comme causalité une augmentation des risques sanitaires et des conditions climatiques plus sèches qui conduiront à une augmentation du nombre de jours avec un risque significatif de feu de végétation.

Attention : Géorisques identifie une vulnérabilité aux feux de forêt sur votre EPCI




Caractérisation des principaux risques naturels


Catastrophes naturelles	Nombre d'arrêtés sur la CC Du Minervois au Caroux entre 1982-2019
Inondations	210
Mouvements de terrain	4
Tempêtes	36
Retrait-gonflement des argiles	7
Sécheresse	0
Coulées de boue	2

Source : GASPAR 2022

TYPE DE CATASTROPHE




CATASTROPHES NATURELLES PAR ANNÉE



Risques naturels	Nombre de communes avec risques naturels	Pourcentage de communes concernées
Risque atmosphérique	0	0%
Avalanche	0	0%
Feu de forêt	34	94%
Inondation	12	33%
Mouvement de terrain	36	100%


Source : SDES 2022



Au total 100 % des communes de la CC Du Minervois au Caroux sont concernées par au moins un risque naturel.

Exposition des populations aux risques climatiques



Le niveau d'exposition des populations aux risques climatiques, déterminé à l'échelle communale, résulte du croisement entre la densité de population et le nombre d'aléas climatiques identifiés et déclarés par les services de l'État pour chaque commune.



L'indice d'exposition aux risques climatiques met en évidence deux communes en niveau d'exposition fort sur le territoire de la CC Du Minervois au Caroux.

- Emissions GES

Unité : kteqCO ²	Cheptel	Culture	Process Industriel	Traitement et stockage des déchets	Energétiques	Gaz fluorés	TOTAL
CC du Minervois au Caroux	7	4	0	0	45	1	57
% PHLV	41 %	33 %	-	-	20 %	20 %	22 %





Les émissions de GES d'origine énergétique de la CC Du Minervois au Caroux représentent 79 % des émissions totales.

- Séquestration carbone

Stock de carbone séquestré par typologie – en kteqCO ²	CC Du Minervois au Caroux
Zones humides	14
Prairies	3 121
Forêts	29 436
Sols artificialisés	207
Sols cultivés	2 924
Haies	469
Autres dont produits bois	99
TOTAL stock de carbone séquestré	36 270
<i>Séquestration nette annuel</i>	<i>280</i>
<i>Taux d'accroissement annuel du stock de carbone</i>	<i>0,34</i>

Source : Dreal Occitanie - 2018



Au total, ce sont plus de 36 millions de tonnes de CO2 qui sont stockées sur le territoire. Les forêts représentent près deux tiers des surfaces du territoire et contiennent plus de 80 % du stock de carbone.